

CANDIDATO/A.....DATA.....PROVA PRATICA 1

1. UNA VOLTA ESEGUITO LO SCREENING METABOLICO IN UN NEONATO, IL CAMPIONE RACCOLTO DEVE ESSERE:

- a) custodito in un sacchetto di polietilene per mantenere umido il campione
- b) asciugato con l'ausilio di un getto d'aria calda
- c) fatto asciugare lontano da fonti di calore

2. COME E QUANDO VIENE ESEGUITA LA TRICOTOMIA PREOPERATORIA?

- a) sempre con il rasoio a mano
- b) sempre il giorno precedente con la lametta
- c) se necessaria con un rasoio elettrico entro il minor tempo possibile prima della procedura

3. L'INFERMIERA QUALE MATERIALE DEVE PREPARARE PER LA RIMOZIONE DI UN DRENAGGIO TORACICO DI UN PAZIENTE CON PNEUMOTORACE DESTRO RICOVERATO IN TERAPIA INTENSIVA PEDIATRICA?

- a) garze e guanti non sterili
- b) clamp, garze sterili, guanti sterili, telino sterile e cerotto
- c) klemmer, aghi da sutura e forbice bottonuta

4. QUANDO IN PRONTO SOCCORSO ARRIVA UN BAMBINO CHE HA INGERITO UNA SOSTANZA TOSSICA, NELL'EFFETTUARE L'ACCERTAMENTO QUALI INFORMAZIONI DEVE REPERIRE L'INFERMIERA?

- a) il tipo di sostanza ingerita, la quantità, il peso del bambino, il tempo intercorso tra l'ingestione e l'arrivo in ospedale ed eventuali sintomi presentati
- b) oltre ai dati anagrafici le generalità di chi accompagna il bambino
- c) domandare se il bambino era a digiuno al momento dell'ingestione

5. NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA POST OPERATORIA DI RIDUZIONE DI FRATTURA DI OMERO CON FISSATORE ESTERNO È IMPORTANTE:

- a) immobilizzare l'arto
- b) controllare i tramiti del fissatore esterno per valutare e monitorare eventuali sanguinamenti
- c) mantenere l'arto in posizione declive

6. DURANTE UNA CRISI CONVULSIVA L'INFERMIERE DEVE:

- a) mantenere pervie le vie aeree e allontanare eventuali oggetti o spigoli
- b) contenere il paziente
- c) sforzare l'apertura della bocca

7. AVENDO A DISPOSIZIONE UNA FIALA DI LASIX DA 20 MILLIGRAMMI IN DUE MILLILITRI, DOVENDONE SOMMINISTRARE 3 MILLIGRAMMI QUANTO FARMACO DEVO ASPIRARE?

- a) 0.8 millilitri
- b) 0.3 millilitri
- c) 0.6 millilitri

8. QUANDO SI INVIA ALLA STERILIZZAZIONE UN DISPOSITIVO MEDICO È NECESSARIO:


- a) il vapore è un agente naturale, non tossico e non danneggia le superfici quindi non occorrono cautele
 - b) nessuna accortezza, soltanto accurato controllo dell'integrità della confezione all'estrazione dall'autoclave
 - c) tener conto delle indicazioni contenute nella scheda tecnica e di trattamento del prodotto
-

9. DOPO LA RIMOZIONE DEI GUANTI L'OPERATORE, SECONDO LE LINEE GUIDA, DEVE EFFETTUARE IL LAVAGGIO DELLE MANI?

- a) sì
- b) no
- c) solo in sala operatoria

10. QUANTE SONO LE DERIVAZIONI ELETTROCARDIOGRAFICHE?

- a) 4 periferiche e 4 precordiali
- b) 4 periferiche e 6 precordiali
- c) 4 periferiche e 5 precordiali



CANDIDATO/A.....DATA.....

1. LO STOMACARE VIENE ESEGUITO:

- a) effettuando dei movimenti circolari dallo stoma verso l'esterno sfofinando con forza
- b) effettuando dei movimenti circolari dall'esterno verso lo stoma procedendo con delicatezza
- c) effettuando un impacco statico

2. IN CASO DI TRAZIONE TRANSCHELETRICA È NECESSARIO GARANTIRE:

- a) la correttezza del mantenimento della trazione, effettuazione di controlli frequenti dello stato di integrità della cute e rilievo del polso distale alla frattura
- b) la disinfezione pluriquotidiana dei tramiti con iodio-povidone e rilievo dei parametri vitali
- c) l'effettuazione di esercizi attivi e passivi delle articolazioni a monte della trazione, valutando il rischio di lesioni da pressione con la scala Edin

3. DURANTE IL RICOVERO IN CAMERA DI OSSERVAZIONE BREVE DEL PRONTO SOCCORSO DI UN BAMBINO DI 4 ANNI PER DOLORE ADDOMINALE, QUALE SCALA DI VALUTAZIONE BISOGNA UTILIZZARE PER MISURARE IL DOLORE?

- a) Scala FLACC
- b) Scala NRS
- c) Scala WONG BAKER

4. SE AD UN BAMBINO DI 5 ANNI DEVE ESSERE SOMMINISTRATA INSULINA, QUALI VIE DI SOMMINISTRAZIONE DEVE UTILIZZARE L'INFERMIERA?

- a) rettale
- b) sotto cute o endovenosa
- c) orale

5. PER PREVENIRE IL DOLORE DA PUNTURA DEL TALLONE PER ESEGUIRE UN ESAME CAPILLARE DI UN NEONATO, QUALI ACCORGIMENTI NON FARMACOLOGICI DEVONO ESSERE MESSI IN ATTO?

- a) aspettare che il neonato dorma profondamente dopo un pasto di latte e contenerne la postura con un telino, pungere con un ago grosso per facilitare la fuoriuscita del sangue
- b) informare la mamma, offrire al bambino un succhietto, applicare la borsa del ghiaccio dopo la esecuzione dell'esame per arrestare in fretta l'uscita del sangue
- c) informare la mamma ed assegnarle un ruolo attivo invitandola a somministrare qualche goccia di glucosio o latte, attaccando il bimbo al seno, riscaldare il tallone per favorire la vascolarizzazione e facilitare il sanguinamento, preferire una microlancia a molla e non spremere il tallone

6. PER COLLOCARE IL MATERIALE STERILE SUL CAMPO STERILE OCCORRE:

- a) aprire la confezione tagliandola con una forbice bottonuta facendola cadere sul piano e spostandola al centro del campo con una pinza anatomica
- b) aprire la confezione del materiale sterile scostandone i due lembi, tirando contemporaneamente i bordi nel punto indicato/invito, facendo attenzione a non toccare con le mani il bordo interno della confezione e/o il materiale in essa contenuto, tenendo il materiale a circa 20-30 cm al di sopra del piano di lavoro facendolo cadere al centro del campo sterile
- c) tagliare il bordo della confezione con una forbice retta, prelevare il contenuto della confezione con una pinza curva e posizionare il contenuto della confezione sul piano.

7. AVENDO A DISPOSIZIONE 1 FIALA DI VITAMINA K DA 10 MILLIGRAMMI IN 1 MILLILITRO, DOVENDONE SOMMINISTRARE 1 MILLIGRAMMO QUANTO FARMACO DEVO ASPIRARE?

- a) 0,5 millilitri
- b) 0,4 millilitri
- c) 0,1 millilitri

8. COME SI APPLICA UNA CREMA ANESTETICA AD UN BAMBINO DI 6 ANNI PER RIDURRE IL DOLORE DOVENDO EFFETTUARE UNA VENIPUNTURA SUL DORSO DELLA SUA MANO DESTRA?

- a) si informa il caregiver, si prepara il materiale, si identifica il bambino, si effettua l'igiene delle mani, si individua l'area da anestetzare, la si deterge, si applica la dose di crema prescritta, si posiziona un cerotto occlusivo semipermeabile sopra la crema, mantenendo l'applicazione per un'ora poi la si rimuove verificando se sono comparse reazioni locali.
- b) si prepara il materiale, si effettua l'igiene delle mani, si individua l'area da anestetzare, si applica una dose abbondante della crema
- c) si effettua l'igiene delle mani, si individua l'area da anestetzare, si applica una dose minima della crema, si posiziona un cerotto di garza sopra la crema, si rimuove l'applicazione quando l'infermiera è pronta ad effettuare la venipuntura

9. COME DEVE ESSERE IL CONTENITORE PER L'ESAME DELLA COPROCOLTURA?

- a) Contenitore non sterile di plastica con coperchio
- b) Contenitore sterile con tampone o palettina e coperchio
- c) Importante che sia di vetro

10. IN QUALE SETTING ASSISTENZIALE L'INFERMIERA DEVE AVERE A DISPOSIZIONE LA FASCIA DI TIPO DESAULT?

- a) ambulatorio di cardiologia
- b) reparto di malattie infettive pediatriche
- c) sala gessi/pronto soccorso



CANDIDATO/A.....DATA.....

1. LA SCALA DI VALUTAZIONE BRADEN Q SI UTILIZZA PER VALUTARE IL RISCHIO DI SVILUPPARE UNA LESIONE DA PRESSIONE IN UN PAZIENTE DI 6 ANNI SEDATO ED INTUBATO:

- a) vero
- b) falso
- c) falso e si usa la Scala GLASGOW

2. IN CASO DI PRESENZA DI DRENAGGIO ADDOMINALE IN UN PAZIENTE DI 9 ANNI, CHE COSA SI DEVE VALUTARE:

- a) la comparsa di dolore ed i parametri vitali
- b) monitoraggio sistematico del punto di inserzione, della quantità e della qualità di liquido drenato, mantenimento dell'asepsi del drenaggio stesso
- c) che il paziente si alimenti con cibi leggeri

3. QUALI INTERVENTI ASSISTENZIALI NON FARMACOLOGICI DEVONO ESSERE ATTUATI IN CASO DI IPERPIRESSIA IN UN PAZIENTE DI 4 ANNI?

- a) monitoraggio della temperatura, controllo del bilancio idrico, promozione del riposo, controllo dell'introduzione di liquidi, spugnature tiepide
- b) monitoraggio della temperatura, apertura delle finestre, applicazione di spugnature con alcol
- c) consigliare il riposo a letto

4. IN PRONTO SOCCORSO ACCADE UN BAMBINO CON DISTRESS RESPIRATORIO: QUALI SONO GLI ELEMENTI CHE DEVONO ESSERE SUBITO VALUTATI?

- a) condizioni generali, stato di coscienza
- b) dati anagrafici, peso e altezza
- c) stato di coscienza, parametri vitali, tipo e frequenza del respiro

5. QUAL È LA POSIZIONE CORRETTA PER ATTUARE UNA EFFICACE PREVENZIONE DELLA SINDROME DELLA MORTE IMPROVVISA DEL LATTANTE (SIDS)?

- a) supina, perché è l'unica posizione di provata efficacia per la prevenzione della SIDS
- b) in decubito laterale sinistro per evitare l'inalazione di eventuali rigurgiti
- c) prona, perché è l'unica posizione di provata efficacia per la prevenzione della SIDS

6. AVENDO A DISPOSIZIONE UNA FIALA DI ANTIBIOTICO DA 500 MILLIGRAMMI DILUITO IN 10 MILLILITRI DI SOLUZIONE FISIOLÓGICA, DOVENDONE SOMMINISTRARE 150 MILLIGRAMMI, QUANTO FARMACO DEVE ESSERE ASPIRATO DAL FLA CONCINO?

- a) 2 millilitri
- b) 4 millilitri
- c) 3 millilitri

7. PER ALLESTIRE UN CAMPO STERILE PER EFFETTUARE UNA PROCEDURA, QUALE MATERIALE DEVE ESSERE PREPARATO?

- a) superficie piana di lavoro (carrello o tavolino servitore), guanti sterili, mascherina chirurgica, teli sterili, il materiale sterile necessario alla procedura
- b) teli sterili impermeabili, guanti sterili, camici monouso, arcelle per lo smaltimento dei rifiuti
- c) cuffia di tela, camici sterili, contenitori chiusi per rifiuti taglienti, guanti monouso

8. TRA IL MATERIALE CHE DEVE ESSERE PREDISPOSTO PER INTRODURRE UN SON DINO NASOGASTRICO IN UN BAMBINO DI 3 ANNI DEVONO COMPARIRE:

- a) craniometro, cerotto a nastro, bende di garza orlata e sgrassante per la cute
- b) cartina al tornasole per la misurazione del pH, cerotto di tela o di tessuto non tessuto, garze, fonendoscopio, teli, sondino della misura adatta all'età e al peso del bambino
- c) metro a nastro, soluzione glucosata, apparecchio per aerosol, laccio emostatico

9. IN QUALE CONTENITORE SI SMALTISCONO I RIFIUTI CONTAMINATI DA SOSTANZE ANTIBLASTICHE IN OSPEDALE?

- a) Contenitore per rifiuti indifferenziati
- b) Non esiste un contenitore dedicato
- c) Contenitore specifici con la dicitura "rifiuti sanitari pericolosi- citotossici e citostatici"

10. COME SI MISURA LA TEMPERATURA CORPOREA NEL BAMBINO?

- a) entrambe le risposte sono corrette
- b) utilizzando un termometro digitale
- c) utilizzando un termometro ad infrarossi

1. LO STOMACARE VIENE ESEGUITO:

- a) effettuando dei movimenti circolari dallo stoma verso l'esterno sfofinando con forza
- b) effettuando dei movimenti circolari dall'esterno verso lo stoma procedendo con delicatezza**
- c) effettuando un impacco statico

2. IN CASO DI TRAZIONE TRANSCHELETRICA È NECESSARIO GARANTIRE:

- a) la correttezza del mantenimento della trazione, effettuazione di controlli frequenti dello stato di integrità della cute e rilievo del polso distale alla frattura**
- b) la disinfezione pluriquotidiana dei tramiti con iodio-povidone e rilievo dei parametri vitali
- c) l'effettuazione di esercizi attivi e passivi delle articolazioni a monte della trazione, valutando il rischio di lesioni da pressione con la scala Edin

3. DURANTE IL RICOVERO IN CAMERA DI OSSERVAZIONE BREVE DEL PRONTO SOCCORSO DI UN BAMBINO DI 4 ANNI PER DOLORE ADDOMINALE, QUALE SCALA DI VALUTAZIONE BISOGNA UTILIZZARE PER MISURARE IL DOLORE?

- a) Scala FLACC
- b) Scala NRS
- c) Scala WONG BAKER**

4. SE AD UN BAMBINO DI 5 ANNI DEVE ESSERE SOMMINISTRATA INSULINA, QUALI VIE DI SOMMINISTRAZIONE DEVE UTILIZZARE L'INFERMIERA?

- a) rettale
- b) sotto cute o endovenosa**
- c) orale

5. PER PREVENIRE IL DOLORE DA PUNTURA DEL TALLONE PER ESEGUIRE UN ESAME CAPILLARE DI UN NEONATO, QUALI ACCORGIMENTI NON FARMACOLOGICI DEVONO ESSERE MESSI IN ATTO?

- a) aspettare che il neonato dorma profondamente dopo un pasto di latte e contenerne la postura con un telino, pungere con un ago grosso per facilitare la fuoriuscita del sangue
- b) informare la mamma, offrire al bambino un succhietto, applicare la borsa del ghiaccio dopo la esecuzione dell'esame per arrestare in fretta l'uscita del sangue
- c) informare la mamma ed assegnarle un ruolo attivo invitandola a somministrare qualche goccia di glucosio o latte, attaccando il bimbo al seno, riscaldare il tallone per favorire la vascolarizzazione e facilitare il sanguinamento, preferire una microlancia a molla e non spremere il tallone**

6. PER COLLOCARE IL MATERIALE STERILE SUL CAMPO STERILE OCCORRE:

- a) aprire la confezione tagliandola con una forbice bottonuta facendola cadere sul piano e spostandola al centro del campo con una pinza anatomica
- b) aprire la confezione del materiale sterile scostandone i due lembi, tirando contemporaneamente i bordi nel punto indicato/invito, facendo attenzione a non toccare con le mani il bordo interno della confezione e/o il materiale in essa contenuto, tenendo il materiale a circa 20-30 cm al di sopra del piano di lavoro facendolo cadere al centro del campo sterile**
- c) tagliare il bordo della confezione con una forbice retta, prelevare il contenuto della confezione con una pinza curva e posizionare il contenuto della confezione sul piano.

7. AVENDO A DISPOSIZIONE 1 FIALA DI VITAMINA K DA 10 MILLIGRAMMI IN 1 MILLILITRO, DOVENDONE SOMMINISTRARE 1 MILLIGRAMMO QUANTO FARMACO DEVO ASPIRARE?

- a) 0,5 millilitri
- b) 0,4 millilitri
- c) 0,1 millilitri**

8. COME SI APPLICA UNA CREMA ANESTETICA AD UN BAMBINO DI 6 ANNI PER RIDURRE IL DOLORE DOVENDO EFFETTUARE UNA VENIPUNTURA SUL DORSO DELLA SUA MANO DESTRA?

- a) si informa il caregiver, si prepara il materiale, si identifica il bambino, si effettua l'igiene delle mani, si individua l'area da anestetzare, la si deterge, si applica la dose di crema prescritta, si posiziona un cerotto occlusivo semipermeabile sopra la crema, mantenendo l'applicazione per un'ora poi la si rimuove verificando se sono comparse reazioni locali.**
- b) si prepara il materiale, si effettua l'igiene delle mani, si individua l'area da anestetzare, si applica una dose abbondante della crema
- c) si effettua l'igiene delle mani, si individua l'area da anestetzare, si applica una dose minima della crema, si posiziona un cerotto di garza sopra la crema, si rimuove l'applicazione quando l'infermiera è pronta ad effettuare la venipuntura

9. COME DEVE ESSERE IL CONTENITORE PER L'ESAME DELLA COPROCOLTURA?

- a) Contenitore non sterile di plastica con coperchio
- b) Contenitore sterile con tampone o palettina e coperchio**
- c) Importante che sia di vetro

10. IN QUALE SETTING ASSISTENZIALE L'INFERMIERA DEVE AVERE A DISPOSIZIONE LA FASCIA DI TIPO DESAULT?

- a) ambulatorio di cardiologia
- b) reparto di malattie infettive pediatriche
- c) sala gessi/pronto soccorso**