

1. CHE COS'È IL TRIAGE?

- a) È un sistema di valutazione rapido degli assistiti che accedono al Pronto Soccorso utilizzando protocolli standardizzati e condivisi
- b) È un sistema di valutazione rapido degli assistiti che accedono al Pronto Soccorso utilizzando l'occhio clinico dell'infermiere esperto di pronto soccorso
- c) È una attività prettamente medica

2. COME SI MANIFESTA UNA CRISI CONVULSIVA IPOTONICA IN UN BAMBINO DI TRE ANNI?

- a) comparsa di crisi con scosse
- b) comparsa di crisi con rilassamento della muscolatura
- c) comparsa di crisi con irrigidimento

3. LA DISPLASIA CONGENITA DELL'ANCA NEL NEONATO È RICONOSCIBILE DA QUALE SEGNO:

- a) il metatarso varo
- b) la presenza di osteomielite
- c) lo scatto di ortolani

4. UN BAMBINO DI 3 ANNI CON SOSPETTO MORBO DI HIRSCHSPRUNG, IN QUANTO OCCLUSO, PRESENTA UN ALVO:

- a) aperto a feci e gas
- b) chiuso
- c) con feci semiliquide

5. QUALI COMPLICANZE DEVE RICONOSCERE UN INFERMIERE CHE PIANIFICA L'ASSISTENZA AD UN PAZIENTE DI 10 ANNI SOTTOPOSTO A VENTILAZIONE INVASIVA?

- a) infettive, ostruttive e dislocazione del presidio
- b) solo infettive
- c) il difetto di comunicazione

6. SE NELL'ASSEGNARE IL PUNTEGGIO DI APGAR AD UN NEONATO AD UN MINUTO DALLA NASCITA SI RILEVA UN VALORE PARI A 6:

- a) si sospende prontamente ogni ulteriore controllo poiché il bambino è in pericolo di vita e si allerta la terapia intensiva neonatale per attuare un ricovero d'urgenza

- b) si ripete l'assegnazione del punteggio ancora a dieci minuti e si trasferisce il bambino in terapia intensiva neonatale
- c) si procede continuando ad assegnare il punteggio a cinque, dieci, quindici fino a venti minuti, attuando le opportune manovre di rianimazione fino a raggiungere un punteggio di almeno 7, se si fallisce si allerta la terapia intensiva neonatale per attuare un ricovero d'urgenza

7. PRIMA DI ESEGUIRE IN CONDIZIONI FISIOLOGICHE UNO SCREENING METABOLICO IN UN NEONATO OCCORRE ACCERTARSI CHE:

- a) il neonato sia a digiuno, in quanto l'assunzione di latte potrebbe interferire sull'esito dell'esame
- b) il neonato deve aver almeno assunto un pasto di colostro, latte materno o di formula indifferentemente.
- c) il neonato deve aver assunto almeno un pasto e deve aver eseguito un clistere di pulizia per essere certi che abbia eliminato la maggior parte del meconio.

8. L'INDICE DI MASSA CORPOREA (BODY MASS INDEX) UTILIZZATO NELLA VALUTAZIONE DI ACCRESCIMENTO DEL BAMBINO È:

- a) un calcolo che mette in relazione il peso e l'altezza e aiuta a classificare se un bambino è sottopeso, normopeso o sovrappeso in relazione all'età
- b) uno schema precompilato che valuta statura e indice glicemico
- c) uno schema precompilato che valuta circonferenza cranica il metabolismo degli zuccheri

9. COSA SI INTENDE PER RISCHIO CLINICO

- a) Probabilità che un paziente ricoverato subisca un danno in conseguenza delle cure sanitarie
- b) Probabilità che ha una persona sana di ammalarsi per il fumo di sigaretta
- c) Possibilità che un clinico si ammali curando un paziente

10. QUAL È L'ANNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE PEDIATRICO?

- a) 1994 con il DM 739
- b) 1997 con il DM 70
- c) 1994 con il Decreto 740

GIULIA TAFTELLI 30/05/25
PROVA NON ESTRATTA

PROVA SCRITTA 2



1. CHE COSA INDICA IN TRIAGE IL CODICE DI GRAVITA' ROSSO?
 - a) soggetto acuto da rivalutare entro trenta minuti
 - b) soggetto critico da valutare immediatamente
 - c) soggetto non urgente da non rivalutare

2. COME SI MANIFESTA UNA CRISI CONVULSIVA FEBBRILE IN UN BAMBINO DI 3 ANNI?
 - a) comparsa di crisi generalizzate che si manifestano in presenza di febbre
 - b) perdita di conoscenza
 - c) comparsa di tremori all'arto inferiore destro

3. IN UN BAMBINO DI 10 ANNI CHE PRESENTA UNA FRATTURA DI GAMBA SCOMPOSTA NON RIDUCIBILE CON MANOVRE ESTERNE, IL MEDICO PRESCRIVE UNA:
 - a) trazione transcheletrica
 - b) fasciatura con bende all'ossido di zinco
 - c) posizionamento doccia

4. IN UN NEONATO CON STENOSI IPERTROFICA DEL PILORO IL SINTOMO PRINCIPALE È:
 - a) rigurgito
 - b) vomito fecaloide
 - c) vomito a getto

5. LA RELAZIONE TRA INFERMIERA, ADOLESCENTE BULIMICO E CAREGIVER È:
 - a) un elemento che contrasta la compliance terapeutica
 - b) uno strumento terapeutico
 - c) un fattore che aumenta l'ansia

6. NELL'ASSEGNARE IL PUNTEGGIO DI APGAR AD UN NEONATO AD UN MINUTO DALLA NASCITA L'INFERMIERA VALUTA:
 - a) colorito, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, tono muscolare e reattività agli stimoli
 - b) colorito, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, tono muscolare e comparsa riflesso di moro
 - c) colorito, frequenza cardiaca, frequenza respiratoria, tono muscolare e comparsa di gemito espiratorio

7. L'INFERMIERE CHE ASSISTE UN BAMBINO AFFETTO DA DIABETE MELLITO DI TIPO 1, QUANDO DEVE MISURARE LA GLICEMIA CAPILLARE?

- a) solo prima di andare a dormire
- b) solo dopo attività fisica
- c) prima dei pasti, dopo i pasti e prima di andare a dormire

8. QUAL È L'OBIETTIVO DELLA STERILIZZAZIONE:


- a) fornire un prodotto sterilizzato all'utilizzatore, riducendo il consumo di materiale monouso in una visuale di rispetto dell'ambiente
- b) fornire un prodotto sterile all'utilizzatore, ridurre al minimo il rischio di infezione del paziente e ridurre il rischio biologico dell'operatore
- c) fornire un prodotto che riduca il rischio di infezione al paziente e al familiare/caregiver che presta assistenza

9. COSA SI INTENDE PER ANALISI PROATTIVA DEL RISCHIO CLINICO?

- a) studio della probabilità che avvenga un errore in sanità
- b) individuazione delle potenziali minacce, loro valutazione ed elaborazione di strategie di mitigazione
- c) studio dell'evento avverso dopo che lo stesso si è verificato

10. CON QUALE LEGGE SI ISTITUI' IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE IN ITALIA?

- a) Legge 898/1970
- b) Legge 977/1967
- c) Legge 833/ 1978



PROVA SCRITTA 3

1. CHE COSA INDICA IN TRIAGE IL CODICE DI GRAVITÀ BIANCO?
 - a) soggetto critico da valutare immediatamente
 - b) soggetto acuto da rivalutare in tempi brevi
 - c) soggetto dalla condizione stabile, di minima rilevanza clinica
2. COME SI MANIFESTA UNA CRISI CONVULSIVA CLONICA IN UN BAMBINO DI 4 ANNI?
 - a) comparsa di irrigidimento
 - b) comparsa di rilassamento della muscolatura
 - c) comparsa di scosse
3. IN UN BAMBINO DI 2 ANNI CHE PRESENTA UNA FRATTURA DI FEMORE SCOMPOSTA, IL MEDICO PRESCRIVE:
 - a) fasciatura con benda elastica
 - b) posizionamento del paziente sul lettino di bryant o lettino americano
 - c) posizionamento valva gessata
4. QUALI DI QUESTI STRUMENTI O TECNICHE GARANTISCE LA PERVIETÀ' DELLE VIE AEREE IN UN BAMBINO DI 10 ANNI CON DISTRESS RESPIRATORIO NON COSCIENTE
 - a) intubazione tracheale
 - b) cannule nasali
 - c) applicazione di tenda per ossigenoterapia
5. ALLA NASCITA, NELL'ASSEGNARE IL PUNTEGGIO DI APGAR, SI PROCEDE CON QUALE TEMPISTICA?
 - a) un minuto, dieci minuti
 - b) un minuto, venti minuti
 - c) un minuto, cinque minuti
6. LO SCREENING METABOLICO IN UN NEONATO DEVE ESSERE ESEGUITO CON QUALI TEMPISTICHE:
 - a) tra le 20 e le 40 ore dalla nascita
 - b) tra le 48 e le 72 ore dalla nascita
 - c) tra le 10 e le 60 ore dalla nascita
7. QUALI TECNOLOGIE DI NUOVA GENERAZIONE L'INFERMIERE CHE ASSISTE UN BAMBINO DI 8 ANNI AFFETTO DA DIABETE MELLITO DI TIPO 1 DEVE CONOSCERE?

- a) sensore per rilievo glicemia, penne intelligenti, sistemi di somministrazione automatica di insulina
- b) solo il glucometro
- c) solo le penne intelligenti

8. IN UN BAMBINO OCCLUSO DI 7 ANNI CHE PRESENTA UN RISTAGNO BILIARE, L'ASPIRATO GASTRICO AVRA' UN COLORE:

- a) marrone
- b) lattescente
- c) verde

9. COSA SI INTENDE PER ANALISI REATTIVA DEL RISCHIO CLINICO?

- a) studio della probabilità che avvenga un errore in sanità
- b) individuazione delle potenziali minacce, loro valutazione ed elaborazione di strategie di mitigazione
- c) studio dell'evento avverso dopo che lo stesso si è verificato

10. QUANDO È STATO EMESSO IL NUOVO CODICE DEONTOLOGICO DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE?

- a) 2025
- b) 2023
- c) 2022

PROVA SCRITTA 1

1. CHE COS'È IL TRIAGE?

- a) **È un sistema di valutazione rapido degli assistiti che accedono al Pronto Soccorso utilizzando protocolli standardizzati e condivisi**
- b) È un sistema di valutazione rapido degli assistiti che accedono al Pronto Soccorso utilizzando l'occhio clinico dell'infermiere esperto di pronto soccorso
- c) È una attività prettamente medica

2. COME SI MANIFESTA UNA CRISI CONVULSIVA IPOTONICA IN UN BAMBINO DI TRE ANNI?

- a) comparsa di crisi con scosse
- b) **comparsa di crisi con rilassamento della muscolatura**
- c) comparsa di crisi con irrigidimento

3. LA DISPLASIA CONGENITA DELL'ANCA NEL NEONATO È RICONOSCIBILE DA QUALE SEGNO:

- a) il metatarso varo
- b) la presenza di osteomielite
- c) **lo scatto di ortolani**

4. UN BAMBINO DI 3 ANNI CON SOSPETTO MORBO DI HIRSCHSPRUNG, IN QUANTO OCCLUSO, PRESENTA UN ALVO:

- a) aperto a feci e gas
- b) **chiuso**
- c) con feci semiliquide

5. QUALI COMPLICANZE DEVE RICONOSCERE UN INFERMIERE CHE PIANIFICA L'ASSISTENZA AD UN PAZIENTE DI 10 ANNI SOTTOPOSTO A VENTILAZIONE INVASIVA?

- a) **infettive, ostruttive e dislocazione del presidio**
- b) solo infettive
- c) il difetto di comunicazione

6. SE NELL'ASSEGNARE IL PUNTEGGIO DI APGAR AD UN NEONATO AD UN MINUTO DALLA NASCITA SI RILEVA UN VALORE PARI A 6:

- a) **si sospende prontamente ogni ulteriore controllo poiché il bambino è in pericolo di vita e si allerta la terapia intensiva neonatale per attuare un ricovero d'urgenza**

- b) si ripete l'assegnazione del punteggio ancora a dieci minuti e si trasferisce il bambino in terapia intensiva neonatale
- c) si procede continuando ad assegnare il punteggio a cinque, dieci, quindici fino a venti minuti, attuando le opportune manovre di rianimazione fino a raggiungere un punteggio di almeno 7, se si fallisce si allerta la terapia intensiva neonatale per attuare un ricovero d'urgenza**

7. PRIMA DI ESEGUIRE IN CONDIZIONI FISILOGICHE UNO SCREENING METABOLICO IN UN NEONATO OCCORRE ACCERTARSI CHE:

- a) il neonato sia a digiuno, in quanto l'assunzione di latte potrebbe interferire sull'esito dell'esame
- b) il neonato deve aver almeno assunto un pasto di colostro, latte materno o di formula indifferentemente.**
- c) il neonato deve aver assunto almeno un pasto e deve aver eseguito un clistere di pulizia per essere certi che abbia eliminato la maggior parte del meconio.

8. L'INDICE DI MASSA CORPOREA (BODY MASS INDEX) UTILIZZATO NELLA VALUTAZIONE DI ACCRESCIMENTO DEL BAMBINO È:

- a) un calcolo che mette in relazione il peso e l'altezza e aiuta a classificare se un bambino è sottopeso, normopeso o sovrappeso in relazione all'età**
- b) uno schema precompilato che valuta statura e indice glicemico
- c) uno schema precompilato che valuta circonferenza cranica il metabolismo degli zuccheri

9. COSA SI INTENDE PER RISCHIO CLINICO

- a) Probabilità che un paziente ricoverato subisca un danno in conseguenza delle cure sanitarie**
- b) Probabilità che ha una persona sana di ammalarsi per il fumo di sigaretta
- c) Possibilità che un clinico si ammali curando un paziente

10. QUAL È L'ANNO DI ENTRATA IN VIGORE DEL PROFILO PROFESSIONALE DELL'INFERMIERE PEDIATRICO?

- a) 1994 con il DM 739
- b) 1997 con il DM 70**
- c) 1994 con il Decreto 740